

شاخص های کشوری ایمنی بیمار

- ۱- عوارض بیهوشی (انسداد راه هوایی، آپنه، آتلکتازی، پنومونی، پنوموتوراکس، آریتمی، هیپرتانسیون و آمبولی هوا)
- ۲- مرگ در گروههای تشخیصی با احتمال مرگ پایین (مانند مرگ در بیماران با سوفتگی کمتر از ۴۰٪ بدون بیماری زمینه ای)
- ۳- زخم بستر
- ۴- نارسایی در نجات بیمار
- ۵- جسم خارجی بجا مانده در بدن بیمار به هنگام عمل جراحی
- ۶- پنوموتوراکس در اثر بی امتیاطی گروه درمانی (پس از قرار دادن CVC/ برقراری خط وریدی از نامیه آگزیلاری)
- ۷- عفونت انتفاقی به دلیل مراقبت درمانی (نزف کنترل عفونت)
- ۸- شکستگی لگن بعد از عمل
- ۹- هماتوم یا خونریزی بعد از عمل جراحی (دبرید زخم، قطع عضو و ...)
- ۱۰- افتلالات فیزیولوژیک و متابولیک بعد از عمل
- ۱۱- نارسایی تنفسی بعد از عمل
- ۱۲- آمبولی ریوی ترومبوز عمیق ورید (DVT) بعد از عمل جراحی
- ۱۳- عفونت زخم یا عفونت فون بعد از عمل جراحی (تضخیر رنگ زخم، تب مقاوم)
- ۱۴- جدا شدن زخم بعد از عمل در بیماران جراحی شکمی و لگنی (مانند پس زدن گرافت و نکروز فلاپ)
- ۱۵- پارگی و سوراخ شدگی تصادفی در جریان عمل
- ۱۶- واکنش ناشی از انتقال فون
- ۱۷- آسیب مین تولد- آسیب به نوزاد
- ۱۸- ترومای زایمان طبیعی با ابزار و بدون ابزار
- ۱۹- سوفتگی ناشی از کوتر به علت نوسانات برق اتاق عمل/ بی امتیاطی
- ۲۰- افتادن از تفت/صندلی