

سوالات توانمند سازی بخش اطفال تاریخ : .....

نام و نام خانوادگی : کد ملی : نمره :

<p>۱- آنتی دوت داروهای زیر را بنویسید؟</p> <p>۱- ضداسفردگی: بی کربنات ۲- هپارین: پروتامین سولفات ۳- منیزیم سولفات: گلوکونات کلسیم ۴- آهن: دفروکسامین (دیسفرال)</p> <p>۵- وارفارین: ویتامین k ۶- انسولین : گلوکاگون ۷- مسمومیت باارگانوفسفرها: آتروپین پیراسیدوکسیم ۸- استامینوفین: ان استیل سیستین</p>
<p>۲- چندبیماری که ایزوله گوارشی و چندبیماری که ایزوله تنفسی نیاز دارند بنویسید؟</p> <p>ایزوله گوارشی: وبا اسهال حاد و اسهالهای عفونی و خونی - هپاتیت A</p> <p>ایزوله تنفسی : سرخک - مننژیت- سیاه سرفه- سل - اوریون</p>
<p>۳- درچه مواردی نباید فرد مسموم را وادار به استفراغ کرد؟</p> <p>۱- افراد بی هوش و دچار تشنج ۲- مسمومت با هیدروکربن ها</p> <p>۳- مسمومیت با اسیدها و قلیایی ها ۴- زنان باردار</p>
<p>۴- در موقع حساسیت به تزریق خون چه باید کرد؟(علائم که بیانگر حساسیت است را بنویسید) ؟ فوراً خون را قطع و تزریق نرمال سالیین - اطلاع به پزشک . علائم: برافروختگی صورت - لرز- خارش- راش- سرگیجه</p>
<p>۵- درمان هایپرکالمی را بنویسید؟ کلسیم گلوکونات - گلوکز با انسولین- بی کربنات -در نهایت دیالیز</p>
<p>۶- انواع کیسولهای آتش نشانی موجود در بخش و کاربرد آنها را بنویسید؟</p> <p>کیسول پودری } C02 یا گازی }</p> <p>کیسول گازی: در آتش سوزی هرچیزی که برق در آن بکار رفته باشد مثل کامپیوتر- تلویزیون ودر کل ادوات برقی کاربرد دارد .</p> <p>کیسول پودری : در آتش سوزی که مربوط به فلزات قابل اشتعال مثل سدیم - منیزیم - پتاسیم و یا مایعات قابل اشتعال مثل نفت - بنزین گازوئیل و غیره از کیسول پودری استفاده می کنیم.</p>
<p>۷- بی کربنات سدیم با چه داروهایی نباید از یک رگ داده شوند؟ دوپامین - کلسیم - آدرنالین</p>
<p>۸- داروهایی را که می توان از راه لوله تراشه داد بنویسید ؟ وازوپرسین - آدرنالین - نالوکسان - لیدوکائین - آتروپین</p>

سوالات توانمند سازی بخش اطفال تاریخ : .....

نام و نام خانوادگی : کد ملی : نمره :

۹- در هنگام ماساژ دادن " ماساژ موثر " باید چه ویژگی های داشته باشد و بهترین معیار ارزیابی ماساژ خارجی قلب چیست ؟

تعداد ماساژ موثر بر اساس گاید لاین ۲۰۱۵ حداقل ۱۰۰ ضربه و حداکثر ۱۲۰

عمق ماساژ بر اساس گاید لاین ۲۰۱۵ بین ۵ تا ۶ سانتیمتر

۱۰- Nursing care بیماری که دچار F.C شده را بنویسید ؟

۱- NPO کردن بیمار ۲- بازنگهداشتن راه هوایی و یک طرفه کردن سر بیمار ۳- در صورت نیاز air way دهانی ۴- اکسیژن به بیمار ۵-

در صورت لزوم ساکشن ترشحات ۶ - چک درجه حرارت پاشویه دادن ۷ - تزریق دیازپام ۸- دادن داروی ضد تب

۱۱- Nursing Care بیمار نمونیایی را بنویسید ؟ مصرف مایعات کافی- بخور سرد- در صورت تب پائین و استفاده از تب برها- استفاده از

برونکودیلاتورهای خوراکی و تسکین سرفه - chest physio و در صورت دیسترس تنفسی وصل اکسیژن

۱۲- اسم دیگر بیماری Intusueption کدام است و علائم شایع این بیماری و درمان آن کدام است؟

اینواژیناسیون - علائم آن درد شدید شکمی یا خونریزی رکتال - اسهال خونی- استفراغ - اتساع شکم - توده شکمی - مدفوع ژله ای قرمز

رنگ - بی حالی شدید کودک .

درمان آن ۱- هیدراتاسیون ۲- گذاشتن NGT ۳- آنتی بیوتیک وسیع الطیف ۴- جا اداختن به وسیله باریم انما و یا بوسیله هوا ۵- درمان جراحی

۱۳- در موقع وصل خون چه نکاتی باید رعایت شود؟

۱- دستور پزشک چک شود۲- برگ درخواست خون با برگه کیسه خون از نظر گروه خونی و RH ۳- تاریخ انقضاء شماره کیسه و نام بیمار

چک کنیم ۴- مراحل را برای بیمار توضیح دهیم ۵- خون را با گرم کن مخصوص گرم می کنیم ۶- آنژیوکت مناسب باشد۷- قبل از تزریق علائم

حیاتی چک و بعد از وصل در نیم ساعت اول هر ربع ساعت علائم حیاتی چک و علائم حیاتی را چک و تا ۱۵ دقیقه اول خون به آرامی برود و

تایک ساعت اول هر نیم ساعت علائم حیاتی چک می شود.

۱۴- تست های تأییدی تب مالت را بنویسید و چه موقع آزمایش مثبت است؟

تست های کومیزرایت و 2ME . وقتی تست رایب از ۱/۸۰ بیشتر باشد مثبت است

۱۵- سوزن LP بین کدام مهره ها وارد می شود و عارضه اصلی LP کدام است و در آزمایش چه چیزی را چک می کنیم ؟

آزمایشات سیتولوژیک - رنگ آمیزی گرم - قند- پروتئین - کشت . بین مهره های کمری ۳-۴ و یا ۴-۵

سوالات توانمند سازی بخش اطفال تاریخ : .....

نام و نام خانوادگی :

کد ملی :

نمره :

<p>۱۶- اسم دیگر بیماری مونونکلئوز عفونی کدام است و علائم این بیماری را بنویسید؟</p> <p><b>اپشتن بار ویروس EBV که علائم آن تب بیش از ۱۰ روز - بزرگی لوزه ها و غدد لنفاوی که به پنی سیلین جواب ندهد - خستگی زودرس - بی اشتها</b></p>
<p>۱۷- پس از ریختن چه مقدار دارو داخل سرم از حجم سرم باید کاسته شود؟ <b>CC ۵۰ به سرم CC ۵۰۰ و CC ۱۰۰۰ به سرم CC ۱۰۰۰</b> اگر اضافه شود باید به همین حجم از سرم کم شود.</p>
<p>۱۸- چه چیزی باید درسفتی باکس ریخته شود و چه موقع باید تعویض شود؟ <b>نیدل و هرچه چیز نوک تیز و برنده - شیشه های شکسته شده . وقتی <math>\frac{3}{4}</math> آن پر شد باید تعویض شود.</b></p>
<p>۱۹- <b>LFT</b> شامل چه آزمایشاتی می باشد؟ <b><math>Alb-Ast-Alt-Alk_{tp}-Bili_{TD}</math></b></p>
<p>۲۰- آموزشهایی که به بیمار <b>UTI</b> داده می شود را بنویسید؟ <b>پس از دفع ادرار کودک از جلو به عقب تمیز و شسته شود- خوردن مایعات فراوان جهت رقیق کردن ادرار- پرهیز از غذاهای محرک و ادویه - دادن استراحت کافی به کودک - نوزادان پسر به موقع ختنه شوند- عدم استفاده از شرت های پلاستیکی - از لباسهای نخی و آزاد و شورت های پنبه ای استفاده کند. پوشاک زودبه زود عوض شود- از لباسهای تنگ و محکم بستن پوشاک خوداری شود- در صورت بی قراری کودک - اشکال در ادرار کردن - احساس بوی بد ادرار به دکتر مراجعه کند.</b></p>
<p>۲۱- به بیماری که آسم دارد چه آموزشهایی در مورد غذا و محرک های بیماری داده می شود؟ <b>محرک ها مثل پشم حیوانات- در خانه حیوانات خانگی مثل مرغ و گربه و غیره نگهداری نکند- دود سیگار و قلیان گردوخاک- اتاق کودک حتی الامکان بدون زیرانداز و فرش و نور کافی داشته باشد- از اسپری ها و عطرها استفاده نشود- گرده گلها- غذا: سفیده تخم مرغ - شیرگاو- لبنیات- ادویه جات- ترشیجات- بادام زمینی - سوسیس- کالباس- غذاهایی که مواد نگهدارنده دارند مثل انواع کنسروها- آب میوه های مصنوعی و غیره</b></p>
<p>۲۲- علائم شایع بیماری کاوازاکی را نام ببرید و درمان آن چگونه است؟ <b>تب بیشتر از ۵ روز- قرمزی چشم ها- قرمزی و تورم زبان(توت فرنگی)- قرمزی و خشکی و ترک خوردگی لبها- قرمزی و ورم دست ها و پاها- تورم غدد لنفاوی گردن و سایر مناطق- پوسته ریزی دور ناخن های دست و مقعد- راش های قرمز در پشت و شکم و کشاله ران. درمان آن <b>IVIG</b> و <b>ASA</b></b></p>
<p>۲۳- طبق نامه رسیده در تاریخ ۹۵/۴/۲۲ تست پنی سیلین ( جدیدترین دستورالعمل ) چگونه باید انجام شود؟</p> <p><b>پنی سیلین <math>10^{cc}</math> آب مقطر را به ویال پنی سیلین یک میلیون واحد اضافه می کنیم و پس از حل شدن یک سی سی از محلول بدست آمده را با ۹ سی سی آب مقطر رقیق و از این محلول برای تست پنی سیلین به این ترتیب استفاده می کنیم. و سپس یک قطره از محلول قابل تست را روی پوست سطح قدامی ساعد قرار می دهیم بعد داخل قطره یک خراش با سرسوزن به اندازه ۵-۳ میلی متری بدون خونریزی می دهیم بعد از ۱۵ تا</b></p>

سوالات توانمند سازی بخش اطفال تاریخ: .....

نمره:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

۲۰ دقیقه اگر قرمزی یا سفتی بیشتر از ۴ میلی متر دیده نشده منفی است و باید بعد تست جلدی که دو خط سرنگ انسولین (۰/۰۲) سی سی از محلول تست را به صورت داخل جلدی ساعد تزریق می کنیم پس از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در صورت عدم تورم و کهیر کمتر از ۳ میلی متر دقت منفی می باشد.

۲۴- فلوجارت دارو دهی صحیح را بکشید؟

مطابقت کاردکس دارویی با دستور پزشک



مطابقت کاردکس با کارت دارویی توسط پرستار



چک دارو از نظر نام - تاریخ انقضا و نحوه تجویز - دوز دارو و زمان مصرف



شستن دست ها و پوشیدن دستکش




شناسایی بیمار



آموزش به بیمار و کنترل بیمار از نظر احتمال آلرژی دارویی و در صورت نیاز بررسی علائم حیاتی



دادن دارو بر اساس نحوه تجویز



موضعی

خوراکی

تزریقی



ارزیابی بیمار از نظر مواردی مثل کنترل درد، تغییر در علائم حیاتی، برطرف شدن تب و همچنین عوارض دارویی و در صورت نیاز اطلاع

به پزشک



ثبت اقدامات انجام شده در پرونده توسط پرستار

سوالات توانمند سازی بخش اطفال تاریخ : .....

نام و نام خانوادگی : کد ملی : نمره :

۲۵- اصطلاح مربوط به هر کدام را بنویسید ؟
۱- خونریزی از بینی: اپیستاکسیس (Epistaxis) ۲ - خلط خونی: هموتیژی ۳- استفراغ خونی: هماتومز ۴- مدفوع حاوی خون قرمز: هماتوچزی ۵- مدفوع حاوی خون تیره : ملنا ۶- خون در ادرار: هماتوری
۲۶- منیزیوم سولفات در بخش اطفال معمولاً در چه بیمارانی داده می شود و مکانیسم عمل آن چیست؟ در بیماران اسهالی و به علت شل کردن عضلات روده و خاصیت خود منیزیم که قابض کننده است.
۲۷- طرز تهیه پودر ORS را چگونه به مادر آموزش می دهید ؟ بعد از شستن دستها و وسایل لازم یک بسته پودر را در یک لیتر آب جوشیده ولرم (یا ۴ لیوان آب) و بعد از حل شدن در یخچال می گذاریم تا کاملاً سرد و خنک شود و بعد از هر بار دفع مقدار لازم را به بیمار می دهیم و بعد از ۲۴ ساعت مایع اضاف شده را دور می ریزیم.
۲۸- علت و علائم بیماری مخملک را بنویسید ؟ علت آن باکتری استرپتوکوک بتاهمولیتیک A می باشد. علائم: سوزش و درد گلو- تورم لنده ها و غدد لنفاوی - تب بالای ۳۸ درجه - در ابتدا روی زبان کودک پوشش سفید رنگی بعد از مدتی به رنگ قرمز و اطراف آن سفید ضایعات پوستی از روز دوم شروع می شود و سرتاسر رنگ بدن را دانه های قرمز فرا می گیرد.
۲۹- یک (۱) سی سی از آمپول آدرنالین $\frac{1}{10000}$ حاوی چند میلی گرم از آمپول می باشد ؟ $1^{cc}$ آن ۰/۱ میلی گرم دارد.
۳۰- آلكالوز متابولیک چه موقع به وجود می آید و بیشترین علت آلكالوز متابولیک در کودکان چیست ؟ به افزایش PH خون بیشتر از ۷/۴۵ و افزایش بی کربنات پلاسما بیشتر از 24ME آلكالوز متابولیک مصرف دیورتیکها و استفراغ شایعترین علت آلكالوز می باشد.
۳۱- در موقع Needling چه کار باید کرد؟ ۱- شستشوی زخم با آب و صابون و کمک به خونریزی ۲- گزارش به پرستار و کنترل عفونت و تکمیل فرم نیدلینگ ۳- اگر پرستار قبلاً واکسن هپاتیت زده باشد تیترآنتی بادی را چک کند اگر کمتر از ۱۰ بود و بیماری که با او نیدلینگ شده HBS Ag منفی بود که باید واکسن هپاتیت را مجدداً تکرار کند ولی اگر تیترآنتی باتی بالای ۱۰ بود اقدام خاصی نمی خواهد. ۴- در صورت مشخص بودن منبع تماس ۱۰-۵ سی سی از بیمار جهت تست هپاتیت B-C-HIV به آزمایشگاه برود و جواب و پیگیری و اقدامات لازم را انجام دهد و اگر بیمار مثبت بود یک دوز هپاتیت B را امینوگلوبین به پرستار تزریق می شود اگر منفی بود باز فوری واکسن هپاتیت B تزریق می گردد.
۳۲- دارویی را که در بیماران فابیسمی نمی توان داد(۵ مورد)؟
۱- داروهای ضد مالاریا (پیریماکین) ۲- کوتزیمکسازول ۳- رفورازولیدین ۴- متیلن بلو ۵- نالیدکسیک اسید ۶- نیترو فورانتوئین ۷- آسپرین با دوز بالا
۳۳- کتابچه توجیهی بدو ورود شامل چه اطلاعاتی است؟

سوالات توانمند سازی بخش اطفال تاریخ: .....

نمره:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

الف. سلامت شغلی و مطالب اختصاصی هر شغل			
ب. سلامت و بهداشت محیط			
ج. معرفی کلی بیمارستان، قوانین اداری و مالی *			
د. همه موارد			
۳۴- بهترین راه کنترل درجه حرارت بعد از جراحی در کودک مبتلا به مگاکولون مادرزادی کدام است؟			
الف. زیر بغل	ب. دهان	ج. مقعد	د. بسته به وضعیت و سن کودک دارد *
۳۵- پژمان کودکی ۶ ساله برای اولین بار دچار خونریزی از بینی شده اولین اقدام شما کدام یک از موارد زیر است؟			
الف. پنبه آغشته به اپی نفرین استفاده کرده و در حفره بینی می گذاریم.			
ب. تامپون خلفی می گذاریم.			
ج. فقط با آب ساده لخته ها را خارج کرده و بینی را تمیز می کنیم.			
د. چند دقیقه با انگشت شست بینی کودک را نگه می داریم.*			
۳۶- کدامیک از توجهات پرستاری زیر باید در کودک مبتلا به استنومیلایت بکار رود؟			
الف. قرار دادن پاها بالاتر از بدن *			
ب. تغییر پوزیشن مکرر بیمار			
د. استفاده از کمپرس سرد و مرطوب			
د. استفاده از کمپرس گرم و مرطوب			
۳۷- کودکی در بخش بستری و دستور ۳۵۰ سی سی سرم قندی ۵٪ در ۲۴ ساعت دارد. میکروست را چند قطره در دقیقه تنظیم می کنیم؟			
الف. ۱۴	ب. ۱۲	ج. ۱۶	د. ۱۷
۳۸- مهمترین مراقبت پرستاری در مورد کودک مبتلا به لوسمی کدامیک از موارد زیر است؟			
الف. توجه به علائم عفونت *			
ب. توجه به علائم دهیدراتاسیون			
ج. توجه به عوارض جانبی داروها			
د. دادن استراحت مطلق به بیمار			
۳۹- در آموزش به کودک مبتل به آسم بر کدام نکته باید تاکید شود؟			
الف. نیاز به دارو درمانی فقط در صورت بروز حمله			
ب. پیشگیری از ابتل ا به عفونت های تنفسی *			
ج. به حداقل رساندن فعالیت های فیزیکی			
د. تنفس دهانی در هوای سرد			

سوالات توانمند سازی بخش اطفال تاریخ: .....

نمره:

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

۴۰- کودک ۵ ساله ای به دنبال درمان تب روماتیسمی از بیمارستان مرخص شده است ، پرستار در آموزش خانواده جهت پیشگیری از عود

بیماری بر کدام نکته تاکید می کند ؟

الف. استراحت نسبی تا یک سال بعد از حمله اولیه بیماری

ب. رژیم غذایی حاوی ویتامین و مواد معدنی زیاد

ج. ادامه درمان با آنتی بیوتیک طبق دستور پزشک\*

د. فراهم کردن زینه فعالیت فیزیکی

۴۱- کودکی ۳ ساله ، با وزن ۱۵ کیلوگرم در حالی که خرخر تنفسی ، احتقان بینی و تورفتگی پره های بینی حین تنفس دارد مراجعه کرده است

. در دم صدای ویز شنیده می شود . میزان  $SPO2 = 91\%$  است. اولین مداخله شما چه خواهد بود ؟

الف. اکسیژن درمانی با ماسک

ب. استفاده از اسپری گشاد کننده ی برونش \*

ج. اینتوبه کردن بیمار

د. اکسیژن درمانی از راه نيزال

۴۲- مهم ترین نکته آموزشی در زمان ترخیص نوزاد مبتلا به شکاف کام که هنوز عمل جراحی نشده کدام است ؟

الف. نحوه مهار کردن نوزاد

ب. پیشگیری از سرما خوردگی

ج. تکنیک تغذیه مناسب \*

د. فراهم کردن محرک های فیزیکی و عاطفی

۴۳- یکی از مسئولیت های پرستار در مراقبت از کودک مبتلا به تب روماتیسمی بررسی علائم خاموشی است . کدام علامت حاکی از درگیری

قلب است؟

الف. کند شدن روند افزایش وزن

ب. کاهش فشار خون

ج. افزایش برونده ادرار

د. افزایش ضربان قلب در خواب \*

۴۴- اگر در یک روز کاری با سوزن به جا مانده در شان های اتاق عمل نیدل استیک شدید کدام اقدام مناسب تر است؟

ب. شستشوی محل آسیب دیده با آب فراوان

الف. شستشو با آب و صابون \*

د. فشردن محل و کمک به خون روی از محل آسیب

ج. ضدعفونی با الکل بتادین



سوالات توانمند سازی بخش اطفال تاریخ : .....

نمره :

کد ملی :

نام و نام خانوادگی :

۴۵- در طی انجام ساکشن لوله تراکیاتومی انجام کدام اقدام ضروری است؟

ب. ریختن ۲ سی سی فیزیولوژی داخل لوله \*

الف. مسدود کردن سوند هنگام وارد کردن آن

د. انجام ساکشن به صورت پی در پی

ج. نگهداری سوند داخل لوله به مدت ۲ دقیقه

۴۶- رژیم غذایی در کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک کدام است؟

ب. پروتئین کم - نمک محدود

الف. پروتئین زیاد- نمک معمولی \*

د. پروتئین معمولی - نمک محدود

ج. پروتئین زیاد- نمک محدود

۴۷- در هنگام احیای قلبی ریوی صفحه مانیتورینگ نوار زیر را نشان می دهد . اقدام درمانی برای این نوع آریتمی چیست و چرا؟



نوار بیانگر فیبریلاسیون بطنی نرم می باشد که از اپی نفرین استفاده کرده که به نوع خشن تبدیل شود و شانس پاسخ به شوک را افزایش دهد.

۴۸- اولین داروی ضد آریتمی بطنی در حین ایست قلبی کدام است؟

الف - Epinephrine      ب- Amiodarone \*      ج- Adenosine      د- Atropine

۴۹- پروپرانولول در چه بیمارانی باید با احتیاط مصرف شود؟

الف- CVA      ب- Asthma \*      ج- unstable Angina      د- lung cancer

۵۰- " تفکر انتقادی " پسر بچه ای ۶ ساله دچار سانحه برق گرفتگی شده و در بیمارستان فوت می کند. در بررسی انجام شده مشخص می

شود که پرسنل تاسسات جهت تعمیر سیستم خنک کننده در اتاق بیمار دیگری دچار اشتباه شده و سیم بدون روپوش را در محل کار رها نموده

پسر بچه بازیگوش وارد اتاق شده ، به سیم برق زده دچار برق گرفتگی و در نهایت باعث مرگ وی شده است. به هرحال با شکایت

پدر بیمار ، پرستار به دادگاه خوانده می شود و به دلیل قصور در انجام وظیفه محکوم می شود(؟؟؟) استاندارد شغلی و جرم و قصور



سوالات توانمند سازی بخش اطفال تاریخ : .....

نمره :

کد ملی :

نام و نام خانوادگی :

پرستار را توضیح دهید؟

استاندارد شغلی : در مراقبت و محافظت از بیماران و جلوگیری از صدمه , پرستار باید مطمئن باشد که همه لوازم استفاده شده در حوزه مراقبتی بیمار مطمئن و ایمن هستند.

قصور : بی دقتی و بی مبالاتی در مراقبت از بیمار و رها نمودن بیمار در بخش و عدم توجه به محیط پیرامون بیمار

جرم : قصور در مراقب و محافظت بیمار در ارتباط با وسایل ناقص و خراب غیر ایمن و عدم گزارش موارد به مافوق و عدم ثبت در دفتر بخش از جمله موارد محکوم شدن پرستاران در دادگاه می باشد.

واحد آموزش بیمارستان امام خمینی (ره)